


Jesienne liczenie ptaków migrujących na zbiornikach wodnych — wstępne wyniki z 2019 r.

Do przeprowadzenia październikowych liczeń ptaków migrujących wytypowano 48 zbiorników i kompleksów stawów rybnych. Skontrolowanych zostało 39 obiektów z tej listy. Obiekty, których nie udało się skontrolować to: St. Ruda Maleniecka, St. Konięcpol, St. Monowskie, Zb. Klimkówka, St. Maliniec, St. Świdry, St. Jamnica (Grębów), Zb. Myczkowce, Zb. Solina. Dodatkowo skontrolowano 7 obiektów, które nie znalazły wytypowane do kontroli, były to: St. Książ Wielki, St. Pławowice, St. Podstole, St. Udórz-Pohulanka, St. Zameczek, Zb. Drzewicki, Żwirownia Oświęcim-Dwory.



W badaniach wzięło udział 30 obserwatorów: Dariusz Baran, Grzegorz Biały, Andrzej Bisztyga, Marcin Borowik, Andrzej Chwierut, Krzysztof Czajowski, Dariusz Czernek, Bogusław Czerwiński, Józef Dukała, Stanisław Gacek, Jarosław Gil, Krzysztof Haja, Grzegorz Kaczorowski, Marek Kapłon, Mirosław Kata, Bogusław Kozik, Wiesław Król, Adam Kut, Katarzyna Matusik, Jacek Niemiec, Artur Oruba, Joanna Przyborowska, Krzysztof Rokita, Jerzy Smykła, Kazimierz Walasz, Jacek Warząła, Damian Wiehle, Tomasz Wilk, Jakub Wyka, Czesław Zontek.



*W chwili pisania tego tekstu jeszcze nie wszystkie dane zostały wprowadzone do bazy.
Przedstawione poniżej wyniki opierają się na danych już wprowadzonych z 40 obiektów.*

Łącznie na skontrolowanych obiektach stwierdzono 41 278 osobników należących do 128 gatunków. Najliczniejszym ptakiem była krzyżówka *Anas platyrhynchos* – stwierdzono 9126 osobników, które stanowiły 22,1% wszystkich stwierdzonych ptaków. Pozostałe najliczniejsze gatunki to łyśka *Fulica atra* (7108 os., 17,2%), czajka *Vanellus vanellus* (4463 os. 10,8%), kormoran *Phalacrocorax carbo* (2478 os. 6%) i gęgawa *Anser anser* (2296 os. 5,6%).


Krzyżówkę obserwowano na wszystkich kontrolowanych obiektach (N=40), rzadziej stwierdzany był łabędź niemy *Cygnus olor*, którego rozpowszechnienie wynosiło 82%. Na uwagę zasługuje również wysokie rozpowszechnienie mewy białogłowej *Larus cachinnans* i czapli siwej *Ardea cinerea* (70%), gatunków, których liczebności nie była wysoka.

Najliczniejsze gatunki ptaków wodno-błotnych obserwowane na zbiornikach Polski Południowo-Wschodniej w październiku 2019 r.

Gatunek	Liczba osobników	Udział procentowy	Liczba obiektów z gatunkiem	Rozpowszechnienie
krzyżówka <i>Anas platyrhynchos</i>	9126	22,1	40	100
łyśka <i>Fulica atra</i>	7108	17,2	25	62,5
czajka <i>Vanellus vanellus</i>	4463	10,8	13	32,5
kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	2478	6,0	27	67,5
gęgawa <i>Anser anser</i>	2296	5,6	8	20
cyraneczka <i>Anas crecca</i>	1437	3,5	19	47,5
śmieszka <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1359	3,3	18	45
łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	1021	2,5	33	82,5
czernica <i>Aythya fuligula</i>	962	2,3	21	52,5
mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>	801	1,9	28	70
krakwa <i>Mareca strepera</i>	798	1,9	12	30
czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>	782	1,9	28	70
głowienka <i>Aythya ferina</i>	780	1,9	21	52,5
perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	707	1,7	27	67,5
czapla biała <i>Ardea alba</i>	444	1,1	19	47,5
nurogęs <i>Mergus merganser</i>	288	0,7	10	25
biegus zmienny <i>Calidris alpina</i>	193	0,5	8	20
kszyk <i>Gallinago gallinago</i>	180	0,4	9	22,5
perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	162	0,4	15	37,5
świstun <i>Mareca penelope</i>	123	0,3	13	32,5




Krzyżówka



Krzyżówka stwierdzona została na wszystkich kontrolowanych obiektach. Największa koncentracja na St. Zator – 5705 osobników – stanowiła 62,5% osobników tego gatunku stwierdzonych w całej Polsce Południowo-Wschodniej. Pozostałe większe koncentracje Zb. Czaniec (384 os.) i St. Buda Stalowska (370 os.) nie przekraczały już 5% ogólnej liczby stwierdzonych krzyżówek.




Łyska



Łyskę obserwowano na większości kontrolowanych obiektów, głównie na Podkarpaciu i Wyżynie Małopolskiej. Największe zgrupowanie na Zb. Kuźnica Warężyńska – 2732 osobników – stanowiło 38,4% wszystkich osobników tego gatunku stwierdzonych w Polsce Południowo-Wschodniej. Duże koncentracje ptaków stwierdzono również na St. Spytkowicach (1028 os.), St. Bugaj (887 os.) i Zb. Tarnobrzeskim (850 os.).



Czajka



Czajkę stwierdzano głównie na dużych kompleksach stawów rybnych na Wyżynie Małopolskiej i Podkarpaciu. Nie stwierdzono natomiast na karpackich zbiornikach zaporowych. Największe zgrupowanie na St. Górkach – 2685 osobników – stanowiło ponad 60% wszystkich osobników tego gatunku stwierdzonych w Polsce Południowo-Wschodniej. Pozostałe duże zgrupowania to 544 osobniki na St. Budzie Stalowskiej i 455 na St. Podstole.

